

30 kg
Peso neto

Somex Destetos



30 kg
Peso neto

Somex Destetos

Somex Destetos



Eficiencia en nutrición

Somex Destetos

30 kg
Peso neto

REGISTRO ICA N°
13697 SL
LOTE N°
Ver al respaldo

30 kg
Peso neto

INDICACIONES

DEL PROTEÍNA PARA CORDEROS ENTRE LOS 1 Y 4 MESES DE EDAD. DESTETAR LOS CORDEROS QUE SEAN RECEPTIVOS APROPIADAMENTE. LOS CALLOS PUEDE FORMARSE EN EL VALLE DEL NALTO PUNTO PROTEGENDO DEL SOL. AL RECEPTIVO A VOLUNTAD EN SU ALIMENTO. ALIADO CON LITIO. EN CASO DE ENFERMEDAD, SE DEBE HACER CONSULTA AL VETERINARIO.

INGREDIENTES

TORVA DE SOPA, SUCRO, SUCRO DE BARRA, AZÚCAR, SODIUM, FOSFATO MONOCÁLCICO, CROMIUM, SODIO DE CLORURO, ORO DE MANGANES, FLOR DE AZÚCAR, ORO DE ZINC, SODIO, SODIO, MELAZA, SODIUM DE SODIO, YODURO DE SODIO, SODIO DE COBALTO, SODIO DE COBRE Y MANGANES DE TRIGO.

PRECAUCIONES

ASIGNAR UN SOLO RECIPIENTE PARA LOS CORDEROS Y NO ALMACENAR CON OTROS MATERIALES. ABRIR, APROPIADAMENTE, EN UN LUGAR SECO Y APROPIADO. EN CASO DE ENFERMEDAD, CONSULTAR AL VETERINARIO.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | MAXIMO | MINIMO |
|---|--------|---------|
| HUMEDAD | 12,0% | |
| FOSFORO | | 1,8% |
| CALCIO | MINIMO | 2,9% |
| AZUFRE | MINIMO | 0,07% |
| ZINC | MINIMO | 0,36% |
| COBRE | MINIMO | 0,10% |
| MAGNESIO | MINIMO | 0,23% |
| CLORURO DE SODIO | MINIMO | 9,0% |
| SELENO | MINIMO | 0,003% |
| COBALTO | MINIMO | 0,002% |
| FLUOR | MAXIMO | 0,019% |
| YODO | MINIMO | 0,0019% |
| EQUIVALENTE PROTEICO DE RETENCION NO PROTEICO | MAXIMO | 28,1% |
| PROTEINA | MINIMO | 11,0% |

Producto elaborado por SOMEX S.A. en su planta de Maestros Km 2,5 vía Maricao, Santiago de los Caballeros, C.R. (Maricao, M.R. S.A.)
Maestros, C.R. 10000. Tel: 31 644 26 00. www.somex.com



Somex Destetos

30 kg
Peso neto



PREMIUM



Somex Destetos

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Destetos en ganadería de carne y lechería tropical en pasturas de media a regular calidad hasta los 250 kilos de peso vivo, igualmente, en ganado de cría en lactancia bajo el sistema creep feeding y en lechería tropical en el momento de aparte de los terneros. usar solo en rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado

(g/Animal/Día) 60 -180

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | | |
|---|--------|---------|
| HUMEDAD | MÁXIMO | 12.0% |
| FÓSFORO | MÍNIMO | 1.9% |
| CALCIO | MÍNIMO | 2.9% |
| AZUFRE | MÍNIMO | 6.0% |
| ZINC | MÍNIMO | 0.36% |
| COBRE | MÍNIMO | 0.10% |
| MAGNESIO | MÍNIMO | 0.23% |
| CLORURO DE SODIO | MÍNIMO | 9.0% |
| SELENIO | MÍNIMO | 0.003% |
| COBALTO | MÍNIMO | 0.002% |
| FLÚOR | MÁXIMO | 0.019% |
| YODO | MÍNIMO | 0.0019% |
| EQUIVALENTE PROTEICO DE NITRÓGENO NO PROTEICO | MÁXIMO | 28.1% |
| PROTEÍNA | MÍNIMO | 11.5% |

ARGUMENTOS DE VENTA

- ✓ Bajo sistema creep feeding se pueden obtener crías más pesadas al destete en promedio con 10 kilos más al igual que en lecherías de trópico bajo.
- ✓ Se logra que los ganados no pierdan peso. En los meses posteriores al destete
- ✓ Siguen ganando peso luego del destete.
- ✓ Se puede lograr en promedio hasta 15 kilos de carne al mes por animal en ganados pos destete.
- ✓ Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 180 (g/Animal/Día).
- ✓ Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.