



Somex **Reproducción** **30-90**

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Cría 30 días antes de parir hasta 90 días después del parto, utilizar en pasturas de mediana calidad. Solo para rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado
(g/Animal/Día) 80 -300

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Humedad	12.00 %	Máx
Proteína Cruda	7.00 %	Mín
Eq. Prot N No Prot.	43.00 %	Máx
Fibra Cruda	5.00 %	Máx
Cenizas	47.00 %	Máx
Grasa	2.00 %	Mín
Fósforo	1.900 %	Mín
Calcio	2.900 %	Mín
Magnesio	0.200 %	Mín
Azufre	6.000 %	Mín
Cobre	0.100 %	Mín
Zinc	0.370 %	Mín
Yodo	0.010 %	Mín
Selenio	0.004 %	Mín
Cobalto	0.001 %	Mín

ARGUMENTOS DE VENTA

- ✓ Las vacas se preñan hasta en 31 días antes de lo normal. (un 23% menos).
- ✓ Mejora la ingesta de forraje.
- ✓ Animales que se vuelven más dóciles y fáciles de trabajar.
- ✓ Se logra preñar más vacas.
- ✓ Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 300 (g/Animal/Día).
- ✓ Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.