

20 kg

Bovimin

20 kg
Peso neto

Bovimin



Eficiencia en nutrición

Bovimin

20 kg

Peso neto

Número de lote: 12061 BL

Lote 101

Fecha de producción:

PVP:

Fecha de venta:

Fecha de producción:

20 kg
Peso neto

INDICACIONES

Se recomienda utilizar Bovimin en las siguientes situaciones:

• En el momento del parto y durante el periodo de lactancia.

• En el momento de la inseminación artificial.

• En el momento de la castración.

• En el momento de la adaptación a nuevos pastos.

• En el momento de la adaptación a nuevos ambientes.

PRECAUCIONES

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades agudas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades crónicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades infecciosas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades parasitarias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades metabólicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades reproductivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades respiratorias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades digestivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades circulatorias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades neurológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades dermatológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades oftálmicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades otológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades nasales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades bucales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades dentales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades maxilares.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades mandibulares.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades labiales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades faciales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades cervicales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades torácicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades abdominales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades pelvicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades genitales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades reproductivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades metabólicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades reproductivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades metabólicas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE	ANIMAL	BOVINOS
PROTEÍNAS	18.00%	18.00%
GRASAS	10.00%	10.00%
CELULOSA	10.00%	10.00%
ALFALFA	10.00%	10.00%
MOHOS	0.00%	0.00%
ALUMINIO	0.00%	0.00%
COBRE	0.00%	0.00%
COBALTO	0.00%	0.00%
YODO	0.00%	0.00%
SELENIO	0.00%	0.00%
CLORURO DE SODIO	0.00%	0.00%

Se recomienda utilizar Bovimin en las siguientes situaciones:

• En el momento del parto y durante el periodo de lactancia.

• En el momento de la inseminación artificial.

• En el momento de la castración.

• En el momento de la adaptación a nuevos pastos.

• En el momento de la adaptación a nuevos ambientes.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades agudas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades crónicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades infecciosas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades parasitarias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades metabólicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades reproductivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades respiratorias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades digestivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades circulatorias.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades neurológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades dermatológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades oftálmicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades otológicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades nasales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades bucales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades dentales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades maxilares.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades mandibulares.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades labiales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades faciales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades cervicales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades torácicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades abdominales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades pelvicas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades genitales.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades reproductivas.

• No utilizar Bovimin en animales con enfermedades metabólicas.

Bovimin

20 kg
Peso neto

GUATEMALA



Bovimin

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Ceba en pasturas de regular calidad, y como alternativa para ganaderías que quieren mejorar el aspecto (pelaje) de los ganados.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional.

Consumo esperado

(g/Animal/Día) 20 -120

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Humedad	5.00 %	Máx
Fósforo	3.00 %	Mín
Calcio	10.00 %	Mín
Azufre	14.00 %	Mín
Magnesio	0.30 %	Mín
Flúor	0.03 %	Máx
Zinc	0.55 %	Mín
Cobre	0.15 %	Mín
Yodo	0.01 %	Mín
Cobalto	0.005 %	Mín
Selenio	0.002 %	Mín
Cloruro de sodio	35.00 %	Mín

ARGUMENTOS DE VENTA

- ✓ Sal mineral con un contenido medio bajo de fósforo que ayuda a mejorar la presentación del ganado, disminuye la incidencia de moscas y complementa el aporte de las pasturas, con un alto contenido de azufre.