

>> HONDURAS



RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Cría 60 días antes de parir hasta 120 días después del parto, utilizar en pasturas de baja calidad. Solo para rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado (g/Animal/Día) 120 -200

COMPOSICIO	DN G	aran	itizada

	Fósforo	5.0 %	Mín
ı	Calcio	6.8 %	Mín
ı	Azufre	6.8 %	Mín
ı	Zinc	0.600 %	Mín
ı	Cobre	0.250 %	Mín
ı	Magnesio	0.840 %	Mín
ı	Cloruro de sodio	18.8 %	Mín
ı	Selenio	0.004 %	Mín
ı	Cobalto	0.004 %	Mín
ı	Yodo	0.02 %	Mín
ı	Equivalente Proteico NNP	47.4 %	Máx
ı	Humedad	5.0 %	Máx
	Flúor	0.05 %	Máx

ARGUMENTOS DE VENTA

- Es un producto desarrollado para mejorar la tasa de preñez de sus vacas de cría cuando estén en forrajes de baja calidad.
- Contiene todos los macro y micro minerales al igual que nitrógeno para complementar la dieta.
- Las vacas se preñan hasta en 20 días antes de lo normal (un 12% menos).
- Mejora la degradación del forraje. Mejora la condición corporal.
- Mayor producción de crias. Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 200 /g/animal/día).
- Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.