



▶▶ **HONDURAS**



Somex Destetos

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Destetos en ganadería de carne y lechería tropical en pasturas de media a regular calidad hasta los 250 kilos de peso vivo, igualmente, en ganado de cría en lactancia bajo el sistema creep feeding y en lechería tropical en el momento de aparte de los terneros. usar solo en rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado

(g/Animal/Día) 60 -180

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

HUMEDAD	MÁXIMO	12.0%
FÓSFORO	MÍNIMO	1.9%
CALCIO	MÍNIMO	2.9%
AZUFRE	MÍNIMO	6.0%
ZINC	MÍNIMO	0.36%
COBRE	MÍNIMO	0.10%
MAGNESIO	MÍNIMO	0.23%
CLORURO DE SODIO	MÍNIMO	9.0%
SELENIO	MÍNIMO	0.003%
COBALTO	MÍNIMO	0.002%
FLUOR	MÁXIMO	0.019%
YODO	MÍNIMO	0.0019%
EQUIVALENTE PROTEICO DE NITRÓGENO NO PROTEICO	MÁXIMO	28.1%
PROTEÍNA	MÍNIMO	11.5%

ARGUMENTOS DE VENTA

- ✓ El destete es una etapa muy productiva si es bien suplementada, este producto contiene minerales y diferentes fuentes de proteína al igual que promotores ruminales. Te recomendamos utilizar en animales en lactancia o recién destetados en pasturas de mediana a baja calidad, el producto contribuye a desarrollar el potencial productivo en esta etapa de vida.
- ✓ Bajo sistema creep feeding se pueden obtener crías más pesadas al destete en promedio con 10 kilos más al igual que en lecherías de trópico bajo.
- ✓ Se logra que los ganados no pierdan peso en los meses posteriores al destete.
- ✓ Siguen ganando peso luego del destete.
Se puede lograr en promedio hasta 15 kilos de carne al mes por animal en ganados pots destete.
- ✓ Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 180 (g/animal/día).
- ✓ Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.